

โรคไข้เลือดออกป้องกันได้

โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดยใช้มาตรการ 5ป 1ว

ปิด



ปิดฝาภาชนะ
ให้สนิท

ปล่อย



ปล่อยปลา
กินลูกน้ำ



ปรับ



ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เป็นที่
เพาะพันธุ์

เปลี่ยน



เปลี่ยนน้ำ
ในภาชนะที่
ปิดไม่ได้

ชดไช่



ชดไช่ยุง
ที่น้ำที่ขัง
บนพื้นดิน เพื่อให้
ไข่แห้งตาย

ปฏิบัติ



ปฏิบัติเป็น
ประจำอย่าง
ต่อเนื่อง
ทุกๆ 7 วัน

5ป

1ว

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 | เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ไทร



โรงพยาบาลโพธิ์ไทร
PHOSAI HOSPITAL



ณรงค์กำจัด **ยุงลาย** ด้วยมาตรการ

3 เก็บ 3 โรค



เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก



เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะ ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้



เก็บน้ำ

ปิดให้มิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำ เป็นประจำทุกสัปดาห์

- ▶ โรคไข้เลือดออก
- ▶ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
- ▶ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย

