



ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๘

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในผู้ป่วยและนักศึกษา รวมทั้งเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพในนักศึกษา

อาศัยอำนาจตามตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิการบดีจึงกำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อในนักศึกษาไว้ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อในนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ในประกาศนี้

“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะกายภาพบำบัด, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และส่วนงานที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลทุกระดับชั้นปี

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยที่มีรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย รวมทั้งนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรบหรือศึกษาดูงานในส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

๓. นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษานในส่วนงานให้ดำเนินการก่อนเข้ารับการศึกษาดังนี้

๒.๑ Measles, Mumps and Rubella (MMR) : ต้องได้รับการฉีดวัคซีน trivalent MMR เพื่อกระตุ้น ๑ เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรภ์

๒.๒ Varicella (Chicken pox) : ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีน ในกรณีที่ไม่ภูมิคุ้มกัน ต้องได้รับวัคซีน VZV ๒ เข็ม ห่างกัน ๑ เดือน เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรภ์

๒.๓ Hepatitis B : ต้องได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ได้แก่ anti HBs antibody with titer และ HBsAg โดยมีแนวทาง ปฏิบัติต่อไป คือ

- anti-HBsAb < ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ควรได้รับวัคซีนตามแนวทางมาตรฐานสำหรับผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ฉีด ๑ เข็มแล้วตรวจซ้ำหลังฉีด ๑ เดือน หากผล anti-HBsAb เป็น negative ให้ฉีดเพิ่ม ๒ เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้
- anti-HBsAb < ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลบวก ควรได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์
- anti-HBsAb > ๑๐ IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ถือว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

๒.๔ Diphtheria, Tetanus and Pertussis : ถ้าไม่ได้รับวัคซีนภายใน ๑๐ ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน dT (ในกรณีที่มีการระบาดของ Pertussis ให้ฉีดวัคซีน Tdap) เพื่อกระตุ้น ๑ เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

๒.๕ Influenza เฉพาะนักศึกษาที่ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย : ต้องได้รับการฉีดวัคซีนปีละ ๑ เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

๔. นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับในข้อ ๒ ยกเว้น ในรายชื่อที่ลู่จนได้ว่าได้รับวัคซีนแล้ว

๕. นักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสงค์มาดูงานหรือเข้ารับการฝึกอบรมในสัปดาห์ และมีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับในข้อ ๒ โดยส่วนงานซึ่งรับเป็นที่ดูงานหรือฝึกอบรมต้องแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นการล่วงหน้า และต้องมีเอกสารแสดงว่าได้รับวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันแล้วก่อนเข้ารับการดูงานหรือฝึกอบรม

๖. การให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมจากประกาศฉบับนี้ ทำได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงาน

๗. การดำเนินการตามประกาศฉบับนี้มีมอบให้ส่วนงานเป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ให้รายงานผลมายังมหาวิทยาลัย

๘. ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามประกาศนี้ และคำวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔



(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ต้องฉีดวัคซีนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง แนวทางป้องกันโรคติดต่อของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559

นักศึกษาต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อ

- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ชนิด B (HBsAg)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี ชนิด B (HBsAb)
- ตรวจหาภูมิคุ้มกันอีสุกอีใส (VZV IgG)

นักศึกษาต้องได้รับวัคซีน ดังต่อไปนี้

(1) Measles, Mumps and Rubella (MMR) : หัด คางทูม หัดเยอรมัน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน trivalent MMR เพื่อกระตุ้น 1 เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรภ์

(2) Varicella (Chicken pox) : อีสุกอีใส ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนได้รับวัคซีน ในกรณีที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน ต้องได้รับวัคซีน VZV 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้หรือตั้งครรภ์

(3) Hepatitis B : ไวรัสตับอักเสบบี ต้องได้รับการตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ได้แก่ anti HBs antibody with titer และ HBsAg โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อไป คือ

- anti-HBsAb < 10 IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ควรได้รับวัคซีนตามแนวทางมาตรฐาน สำหรับผู้ที่เกิดหลังปี พ.ศ.2535 ให้ฉีด 1 เข็มแล้วตรวจซ้ำหลังฉีด 1 เดือน หากผล anti-HBsAb เป็น negative ให้ฉีดเพิ่ม 2 เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

- anti-HBsAb < 10 IU/ml และ HBsAg ให้ผลบวก ควรได้รับคำแนะนำจากอายุรแพทย์

- anti-HBsAb > 10 IU/ml และ HBsAg ให้ผลลบ ถือว่ามีภูมิคุ้มกันแล้ว ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม

(4) Diphtheria, Tetanus and Pertussis : คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก

ถ้าไม่ได้รับวัคซีนภายใน 10 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน dT (ในกรณีที่มีการระบาดของ Pertussis ให้ฉีดวัคซีน Tdap) เพื่อกระตุ้น 1 เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

(5) Influenza : ไข้หวัดใหญ่ เฉพาะนักศึกษาที่ต้องขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย : ต้องได้รับการฉีดวัคซีนปีละ 1 เข็ม เว้นแต่ มีข้อห้ามทางการแพทย์ เช่น แพ้

โดยนักศึกษาจะไปดำเนินการฉีดวัคซีนที่ คลินิกส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค ห้อง 433 ชั้น 4 ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช เมื่อนักศึกษาจบการศึกษา ทางคลินิกส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค จะออกใบรับรองการฉีดวัคซีนให้นักศึกษาทุกคน เพื่อนำไปประกอบเอกสารการสมัครงาน